



Kesimpta Diary

2022-2023


ケシンプタが処方される患者さん、
ご家族のみなさまのために

多発性硬化症 (MS) は、治療せずに放っておくと、多くの場合で再発と寛解を繰り返し、体の機能の障害が徐々に進行してしまうことも少なくありません。

MSと診断されても、今の生活スタイルを崩さず、これからもずっとアクティブな生活を送れるようにするためには、“**早いうち**”から再発を防ぎ、**進行させないための治療**をきちんと行うことが大切です。



(新たな症状が出る、
既存の症状が悪化する)



(イメージ図)



ケシンプタは、MS患者さん※の再発を予防し、
障害の進行を抑えることが期待できるお薬です。

あなたの今の生活をこれからも続けていくために、
ケシンプタの治療をきちんと行ってください。

本冊子は、ケシンプタの治療を忘れないようにする
ためのダイアリーです。

主治医とのコミュニケーションにもお役立てください。

あなたが今後やりたいと願うことが実現できるよう、
多発性硬化症の治療と一緒に続けていきましょう。

※：再発寛解型のMS患者さん、
疾患活動性を有する二次性進行型のMS患者さん

ケシンプタ投与後の体調を「ダイアリー」でチェック

ケシンプタを投与した時の詳細や、投与中に生じた気になる症状・変化、診察時に主治医に直接伝えられなかったことなども記録できる、

『自己投与管理ダイアリー』をご用意しました。

毎回きちんと記録することで、体調の自己管理だけでなく、効果や副作用なども含めて、今後の治療方針の参考にもなりますので、ケシンプタの自己投与が終わったら**必ず記録**して、**受診日に主治医にお見せください。**

毎回、自己投与が終わったら、きちんと記録しましょう！


- ケシンプタ投与日
- 投与部位（おなか、太もも、二の腕）
- 皮下投与実施者（本人、本人以外）
- 投与後の体調
〔「注射に伴う全身反応」(発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 など)の有無〕
- 投与部位の状態〔「注射部位反応」の有無〕
- その他気になる症状
- 次回投与予定日

など



なお、「注射に伴う全身反応」(発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 など)や、「注射部位反応」(赤い、腫れている、痛い、かゆい など)のほかにも、**いつもと違う気になる体調の変化がみられた場合は、**
次回の受診日を待たずに主治医に相談してください。

自己投与管理ダイアリー 記入例

ケシンプタ投与日	2022年9月9日(金)	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離す) 「上腕部の外側(二の腕)」「上腕部の外側」患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p> <p>腹部(おなか)</p> <p>へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部(太もも)</p>	皮下投与実施者を○で囲む	
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労感などについて… 問題ない / (症状あり)	投与後24時間以内にいつもと違う体調の変化があった場合は具体的に記録してください。	
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆいなどについて… 問題ない / (症状あり) (おなかの周りが少し赤くてかゆい)		
その他 気になる症状	気になる症状があれば記録	投与部位に何らかの変化があった場合は具体的に記録	
次回投与予定日	4週後の2022年10月7日(金) 予定	次回投与予定日を忘れないように記録	


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えるべきことを記録

記録日	体調の変化、主治医に伝えるべきこと
9/10(土)	体のたるさと、体が熱い感じ(37.1℃)がする。
9/13(火)	体がまだたるくて、会社を休む。念のため病院に連絡した。
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	<p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		

●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	<p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (〇で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		

●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	<p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (〇で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		

●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	<p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (〇で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		

●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (〇で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	<p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p> <p>上腕部の外側 (二の腕)</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (〇で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		

●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (〇で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	<p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
／ ()	
／ ()	
／ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (〇で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		


●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプダ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (○で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p> <p>へその周り5cm程度は避ける</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		

●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプタ投与日	20 年 月 日 ()	皮下投与実施者	本人 / 本人以外
投与部位 (〇で囲んでください)	 <p>投与部位は毎回変更してください (前回の投与部位から3cm以上離れた場所に投与すること)</p> <p>上腕部の外側 (二の腕) 「上腕部の外側」は、ご家族の方など、患者さんご本人以外の方が投与される場合に限られます。</p> <p>腹部 (おなか) へその周り5cm程度は避けて投与してください。</p> <p>大腿部 (太もも) 鼠径部や膝に近い部位、大腿部の外側・内側は避けて投与してください。</p>		
投与後の体調 (投与後24時間以内)	発熱、頭痛、筋肉痛、寒気、疲労 などについて… 問題ない / 症状あり ()		
投与部位の状態	投与部位が赤い、腫れている、痛い、かゆい などについて… 問題ない / 症状あり ()		
その他 気になる症状			
次回投与予定日	週後の20 年 月 日 () 予定		

●投与日以降～次回投与日の間で、気になる体調の変化や主治医に伝えたいことがあれば記録しましょう

記録日	体調の変化、主治医に伝えたいこと など
/ ()	
/ ()	
/ ()	

ケシンプタの投与日を「カレンダー」でチェック

次回のケシンプタの投与日や受診日を忘れないようにするために、主治医と一緒に使用できる『**投薬・受診日カレンダー**』もご用意しました。

カレンダーに投与日や受診日のシールを貼ってから、その月のページを切り取り、常に目に入る場所（ケシンプタを保存している冷蔵庫など）に置いておきましょう。

投薬・受診日カレンダー 使い方

1

主治医と話し合って決めた、次回のケシンプタの投与日と受診日にシールを貼る



2

シールを貼った月のカレンダーのページを切り取る



3


冷蔵庫など、常に目に入る場所に切り取ったカレンダーを置く




注) シールは、当冊子の巻末のポケットに入っています。

● ケシンプタの投与スケジュール

ケシンプタは、まずは初回・1週後・2週後・4週後に、
4週後以降（維持期）は4週間ごとに、ペン1本分を皮下投与する“ペン型”のお薬であり、
投与の準備～廃棄を通じて手順が簡便です。



● 投与開始4週後以降（維持期）の年間投与スケジュール 一例 イメージ図



この場合、投与開始4週後以降（維持期）は、**年間13回**の治療スケジュールとなります



投薬・受診日カレンダー 記入例



注) シールは、当冊子の巻末のポケットに入っています。

※祝日および祝日名は、法改正により変更になる場合があります。

6 June 2022



sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

✂
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

8 August 2022

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18 山の日	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

✂
キリノジ線

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

9

September 2022



sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	敬老の日	27	28	29	秋分の日	30

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

10 October 2022



sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10 スポーツの日	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

✂
キリッとした線

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

11

November 2022



sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

		1	2	3	4	5
				文化の日		
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
			勤労感謝の日			
27	28	29	30			

✂
キリテジ線

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

12 December 2022



sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。



NEW
YEAR

1 January 2023

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
1	2	3	4	5	6	7
元日	振替休日					
8	9	10	11	12	13	14
	成人の日					
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

✂
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

3 March 2023



sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	春分の日	29	30	31	

✂
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

4 April 2023



sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						昭和の日

✂
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

5 May 2023



sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
	1	2	3 憲法記念日	4 みどりの日	5 こどもの日	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

6 June 2023



sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

✂
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

7

July 2023

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
	海の日					
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

キ
ジ
リ
線

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

8

August 2023

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	山の日	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

✂
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

9

September 2023



sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
	敬老の日					秋分の日
24	25	26	27	28	29	30

✂
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

10 October 2023



sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
	スポーツの日					
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

11

November 2023



sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
			1	2	3 文化の日	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23 勤労感謝の日	24	25
26	27	28	29	30		

✂️
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

12 December 2023



sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

✂
キリライン

● ケシンプタの投与スケジュール



● ケシンプタの保存方法

自己投与を行う時まで、**箱に入れたまま「冷蔵庫」(2~8℃)で保存[#]**してください。
(冷凍庫などで凍結させないこと)

[#] やむを得ず室温(30℃以下)で保存する場合は、
「7日間」は保存可能ですが、この期間内に使用しなかった場合は、
冷蔵庫に戻し7日以内に使用してください。



● ケシンプタの自己投与方法

『ケシンプタ 自己投与ガイドブック』に、
自己投与方法や手順、Q&Aなどが
記載されています。

また、自己投与方法を
「動画」で確認することもできます。



いつもと違う「体調の変化」を感じた時は、すぐに主治医に相談してください。

こちらのシールは、『**投薬・受診日カレンダー**』に貼ってご使用ください

● **ケシンプタの投与日シール**



● **受診日シール**



ケシンプタに関するお薬情報や自己投与方法などは、
こちらからご覧いただけます！

<https://www.tahatuseikoukasyo.jp/kes>



MSに関する情報やお役立ち情報などは、下記webサイトでご覧いただけます！

多発性硬化症.jp

多発性硬化症.jp

検索



医療機関名

不明な点やわからないこと、さらに詳しく知りたいことなどがありましたら、
遠慮なく主治医・薬剤師の先生におたずねください。

ノバルティス ファーマ株式会社

KES00015GK001
2022年5月作成